

Vakcinácia v súvislosti so splenektómiou (CELL)

Odporúčanie hlavného odborníka

Vakcinácia v súvislosti so splenektómiou

- Robíme 2 týždne pred plánovanou splenektómiou, ak nie je možná, tak pred prepustením.
- Všetky 3 vakcíny podávame súčasne:
 - *Proti pneumokokom*
 - *Proti meningokokom*
 - *Proti hemofilom typu B*

Proti pneumokokom

PNEUMO 23 (23 kmeňov pneumokokov)

- za 4-6 týždňov kontrola titru protilátok (protektívna hladina je viac než 1 μ g/ml)
 - *pri nízkej hodnote booster dávka vakcíny a kontrola titru protilátok za 4-6 týždňov*
 - *pri normálnej hladine booster dávka á 5 rokov*
- v prípade pretrvávajúcej imunosupresie kontrola titru protilátok 1x za 6-12 mesiacov
- u pacientov s nedostatočnou protilátkovou odpoveďou možno zvážiť booster dávku PCV 13 vakcínou **Prevenar 13** (13 kmeňov pneumokokov)

Proti meningokokom

NeisVac-C (Meningokoky typ C)

– aplikácia 2 týždne pred SE

Menveo (Meningokoky typ A, C, W135, Y)

– aplikácia za 4 týždne od aplikácie NeisVac-C

- paušálne sa neodporúča revakcinácia

Proti hemofilom typu B

Act-HIB

- za 4-6 týždňov kontrola titru protilátok (protektívna hladina je 3-5 $\mu\text{g/ml}$)
 - *pri nízkej hodnote booster dávka vakcíny a kontrola titru protilátok za 4-6 týždňov*
 - *pri normálnej hladine booster dávka á 5 rokov*
- v prípade pretrvávajúcej imunopresie kontrola titru protilátok 1x za 6-12 mesiacov

Proti chrípke

VAXIGRIP (INFLUVAC, FLUAD, ID FLU)

- celoživotne každoročne na jeseň
- *cestou praktického lekára*